

(1) لتكن  $g$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة بما يلي :  $g(x) = \frac{2x^2 - 1}{(x+2)^2}$

(2) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  ثم أول هندسيا النتيجة المحصل عليها.

(2) لتكن  $h$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بما يلي :  $h(x) = \frac{1-x}{x^2}$

(1) (أ) احسب  $h'(x)$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}^*$ .

(1) (ب) بين أن :  $\forall x \in \mathbb{R}^* : h''(x) = \frac{-2x+6}{x^4}$

(1.5) (ج) استنتج تفرع المنحنى  $(\mathcal{C}_h)$  و احداثيتي نقطة انعطافه.

(3) لتكن  $k$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}$  بما يلي :  $k(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{2x^2 - 4x + 5}$

(1.5) بين أن المستقيم ذا المعادلة  $x=1$  محور تماثل لمنحنى الدالة  $k$  في معلم متعامد  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

### التمرين الثاني : (13 نقطة)

لتكن  $f$  الدالة العددية للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة بما يلي :  $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{2 - 2x}$

و لتكن  $(\mathcal{C}_f)$  منحنائها في معلم متعامد ممنظم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

(0.5) (1) تحقق من أن مجموعة تعريف الدالة  $f$  هي :  $D_f = ]-\infty; 1[ \cup ]1; +\infty[$ .

(1.5) (2) احسب  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  ثم اعط تأويلا هندسيا للنتيجة المحصل عليها.

(1) (3) (أ) احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(0.5) (ب) تحقق من أن :  $(\forall x \in D_f) : f(x) = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} + \frac{2}{1-x}$ .

(1) (ج) استنتج أن المنحنى  $(\mathcal{C}_f)$  يقبل بجوار  $+\infty$  و  $-\infty$  مستقيما مقاربا محددتا معادلته.

(1) (4) (أ) بين أن :  $(\forall x \in D_f) : f'(x) = \frac{(x+1)(3-x)}{2(x-1)^2}$ .

(1.75) (ب) ادرس إشارة  $f'(x)$  ثم ضع جدول تغيرات الدالة  $f$ .

(1) (5) (أ) اكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(\mathcal{C}_f)$  عند النقطة ذات الأفضول  $x_0 = 0$ .

(1) (ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنى  $(\mathcal{C}_f)$  و المستقيم  $(\Delta)$  ذي المعادلة  $y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ .

(1) (ج) بين ان  $I(1; -2)$  مركز تماثل المنحنى  $(\mathcal{C}_f)$ .

(1.5) (6) انشئ ، في المعلم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  ، المماس  $(T)$  و المنحنى  $(\mathcal{C}_f)$ .

(1.25) (7) ناقش مبيانيا ، حسب قيم البارامتر الحقيقي  $m$  ، عدد حلول المعادلة :  $f(x) = m$ .