

الصفحة 1 4	<p>الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا</p> <p>الدورة الاستدراكية 2018</p> <p>-الموضوع-</p> <p>RS25</p>	<p>المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي</p> <p>المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه</p>
------------------	--	---

4	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
9	المعامل	شعبة العلوم الرياضية : "أ" و "ب" (الترجمة الفرنسية)	الشعبة أو المسلك

- La durée de l'épreuve est de 4 heures.
- L'épreuve comporte 4 exercices indépendants.
- Les exercices peuvent être traités selon l'ordre choisi par le candidat.

- L'exercice1 se rapporte aux structures algébriques(3.5 pts)
- L'exercice2 se rapporte aux nombres complexes(3.5 pts)
- L'exercice3 se rapporte au calcul des probabilités(3 pts)
- L'exercice4 se rapporte à l'analyse(10 pts)

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé

L'usage de la couleur rouge n'est pas autorisé

EXERCICE 1 (3.5points) :

On rappelle que $(M_2(i), +, ')$ est un anneau unitaire de zéro la matrice nulle

$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(M_2(i), +, .)$ est un espace

vectorel réel de dimension 4.

Pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $M(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$ et on considère

l'ensemble $E = \{M(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

0.5 1- Montrer que E est un sous-groupe du groupe $(M_2(i), +)$

0.5 2- a) Montrer que E est un sous-espace de l'espace vectoriel $(M_2(i), +, .)$

0.25 b) Montrer que l'espace vectoriel réel $(E, +, .)$ est de dimension 2

0.25 3-a) Montrer que E est stable pour la loi " "

0.5 b) Montrer que $(E, +, ')$ est un anneau commutatif .

4- On définit dans $M_2(i)$ la loi de composition interne T par : pour tout $M(x, y)$ et $M(x', y')$ de $M_2(i)$,

$$M(x, y)TM(x', y') = M(x, y)'M(x', y') - M(y, 0)'M(y', 0)$$

Et soit j l'application de \mathbb{C}^* vers E qui à tout nombre complexe $x + iy$

(où $(x, y) \in \mathbb{R}^2$) fait correspondre la matrice $M(x, y)$ de E

0.25 a) Montrer que E est stable pour la loi "T"

0.25 b) Montrer que j est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, ')$ vers (E, T)

0.25 c) On pose : $E^* = E - \{O\}$. Montrer que (E^*, T) est un groupe commutatif.

0.5 5- a) Montrer que la loi T est distributive par rapport à la loi « + » dans E

0.25 b) Montrer que $(E, +, T)$ est un corps commutatif.

EXERCICE 2 : (3.5 points)

1- Pour tout nombre complexe $z \in \mathbb{C} - \{i\}$ on pose : $h(z) = i \frac{z - 2i}{z - i}$

0.5 a) Vérifier que : $h(z) = z \iff z^2 - 2iz - 2 = 0$

0.5 b) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation (E) : $z^2 - 2iz - 2 = 0$

2- Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé (O, e_1, e_2) .

On note a et b les deux solutions de l'équation (E) tel que : $\text{Re}(a) = 1$

Et pour tout $z \in \mathbb{C} - \{i, a, b\}$ on note $M(z), M'(h(z)), A(a)$ et $B(b)$ les points d'affixes respectivement $z, h(z), a$ et b

0.75 a) Montrer que : $\frac{h(z) - a}{h(z) - b} = - \frac{z - a}{z - b}$

0.75 b) En déduire que : $\overline{(M'B, M'A)} = p + \overline{(MB, MA)}$ [2p]

0.5 3- a) Montrer que si M, A et B sont alignés alors M, A, B et M' sont alignés.

0.5 b) Montrer que si M, A et B ne sont pas alignés alors M, A, B et M' sont cocycliques.

EXERCICE 3 : (3 points)

On lance 10 fois de suite une pièce de monnaie parfaitement équilibrée.

On désigne par X la variable aléatoire égale à la fréquence d'apparition de la face « pile ».

(le nombre de fois d'apparition de la face « pile » divisé par 10)

1 1-a) Déterminer les valeurs prise par X

1 b) Déterminer la probabilité de l'événement $\left[X = \frac{1}{2} \right]$

1 2- Quelle est la probabilité de l'événement : X supérieur ou égale à $\frac{9}{10}$?

EXERCICE 4 :(10points):

Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :

$$f(x) = \sqrt{x}(\ln x)^2 \text{ pour } x > 0 \text{ et } f(0) = 0$$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, i, j)

1-a) Montrer que f est continue à droite en 0

0.5

(On pourra remarquer que : $f(x) = \frac{1}{4} x^{\frac{1}{2}} \ln^2 x$)

0.75

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis interpréter graphiquement le résultat

obtenu

0.75

2- a) Etudier la dérivabilité de f à droite en 0, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu .

0.75

b) Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ puis calculer $f'(x)$ pour $x > 0$.

c) Etudier les variations de f sur $[0, +\infty[$, en déduire que :

1

$$(\forall x \in]0, 1]) \quad 0 \leq \sqrt{x}(\ln x)^2 \leq \left(\frac{4}{e}\right)^2$$

0.5

d) Tracer la courbe (C) dans un repère orthonormé. (On prendra pour unité 2cm)

3- Pour tout réel $x \geq 0$, on pose $F(x) = \int_x^1 f(t) dt$

0.5

a) Montrer que la fonction F est dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$

1

b) Calculer $F'(x)$ pour $x \geq 0$, en déduire le sens de variation de F sur $[0, +\infty[$

0.75

4- a) En utilisant la méthode d'intégration par parties, calculer $\int_x^1 \sqrt{t} \ln t dt$ pour tout $x > 0$

0.75

b) Montrer que pour $x > 0$, $F(x) = -\frac{2}{3} x \sqrt{x} (\ln x)^2 + \frac{8}{9} x \sqrt{x} \ln x - \frac{16}{27} x \sqrt{x} + \frac{16}{27}$

1

c) En déduire l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) et les droites d'équations respectives : $x = 0$, $x = 1$ et $y = 0$

5- Pour tout entier naturel n non nul, on pose : $u_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx$

1

a) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est bornée et strictement monotone.

0.75

b) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

FIN



4

مدة الإنجاز

الرياضيات

المادة

9

المعامل

شعبة العلوم الرياضية : " أ " و " ب " - خيار فرنسية

الشعبة أو المسلك

exercice1	Indication de solution		Barème
1-		sous-groupe	0.5
2-	a)	sous- espace vectoriel	0.5
	b)	$\dim E = 2$	0.25
3-	a)	la stabilité pour $'$	0.25
	b)	$(E, +, ')$ anneau commutatif	0.5
4-	a)	la stabilité pour T	0.25
	b)	homomorphisme	0.25
	c)	(E^*, T) groupe commutatif	0.25
6-	a)	La distributivité	0.5
	b)	$(E, +, T)$ est un corps commutatif	0.25

exercice2	indication de solution		Barème
1-	a)	vérification	0.5
	b)	les deux solutions de l'équation sont : $1+i$ et $-1+i$	2x0.25
2-	a)	l'égalité	0.75
	b)	l'égalité	0.75
3-	a)	l'implication	0.5
	b)	l'implication	0.5

exercice3			
1-	a)	les valeurs prises par X sont : $0, \frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \dots, \frac{9}{10}, 1$	1
	b)	Calcul de $P(X=0) = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$; $P(X=5) = \frac{5}{10} \cdot \frac{1}{2^5} = \frac{1}{64}$	1
2-		Calcul de $P(X=3) = \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{2^5}$	1

exercice4		indication de solution	Barème
1-	a)	continuité à droite en 0	0.5
	b)	calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$0.25	0.75
		calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$0.25	
		B.P de direction l'axe des abscisses.....0.25	
2-	a)	Dérivabilité à droite en 0.....0.5	0.75
		Interprétation graphique.....0.25	
	b)	Dérivabilité sur $]0, +\infty[$0.25	0.75
		calcul de $f'(x)$0.5	
c)	variations de f sur $]0, +\infty[$0.5	1	
	déduction de l'inégalité.....0.5		
d)	représentation graphique avec respect de l'unité de mesure	0.5	
3-	a)	f est continue sur $]0, +\infty[$ et la fonction $x \mapsto \int_0^x f(t)dt$ est sa primitive qui s'annule en 1	0.5
	b)	$F'(x) = -f(x)$0.5	1
variations de F0.5			

4-	a)	calcul de $\int_x^1 \sqrt{t} \ln(t) dt$ pour $x > 0$	0.75
	b)	l'égalité	0.75
	c)	l'aire= $\int_0^1 f(x) dx$; $4cm^2 = F(0)$; $4cm^2 = 4cm^2$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \frac{64}{27} cm^2$ car la fonction F est continue à droite en 0 0.75 pour le calcul de l'intégrale et 0.25 pour l'unité de mesure	1
5-	a)	la suite est bornée.....0.5 la suite est strictement monotone0.5	1
	b)	la suite est convergente.....0.25 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \dots\dots\dots 0.5$	0.75