



استعمال الحاسبة الغير القابلة للبرمجة مسموح به

**التمرين الأول : (3,0 ن)**

- ① ليكن  $n$  عددا صحيحا طبيعيا .
- أ) بين أنه إذا كان  $n$  عددا فرديا فإن  $n^2 \equiv 1[8]$  . 0,50 ن
- ب) بين أنه إذا كان  $n$  عددا زوجيا فإن  $n^2 \equiv 0[8]$  أو  $n^2 \equiv 4[8]$  . 0,50 ن
- ② ليكن  $a$  و  $b$  و  $c$  أعداد صحيحة طبيعية فردية .
- أ) بين أن  $a^2 + b^2 + c^2$  ليس مربعا كاملا . 0,50 ن
- ب) بين أن :  $2(ab + bc + ac) \equiv 6[8]$  . 0,50 ن
- لاحظ أن :  $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$
- ج) استنتج أن :  $2(ab + bc + ac)$  ليس مربعا كاملا . 0,50 ن
- د) بين أن  $(ab + bc + ac)$  ليس مربعا كاملا . 0,50 ن

**التمرين الثاني : (3,0 ن)**

لتكن  $E$  مجموعة المصفوفات التي تكتب على شكل :

$$M_a = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}} \left( a - \frac{1}{a} \right) \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}$$

و  $F$  مجموعة المصفوفات المعرفة بما يلي :

$$N_a = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}} \left( a - \frac{1}{a} \right) \\ -a\sqrt{3} & -a \end{pmatrix}$$

- ① أ) بين أن :  $M_a \times M_b = M_{ab}$  ;  $(\forall (a, b) \in \mathbb{R}^{*2})$  . 0,50 ن
- ب) ليكن  $\varphi$  التطبيق المعرف من  $\mathbb{R}^*$  نحو  $E$  بما يلي :  $\varphi(a) = M_a$  . 0,50 ن
- بين أن :  $\varphi$  تشاكل من  $(\mathbb{R}^*, \times)$  نحو  $(E, \times)$  .
- ج) استنتج البنية الجبرية لـ  $(E, \times)$  . 0,50 ن
- ② أ) بين أن  $N_a \times N_b = M_{\frac{b}{a}}$  ;  $(\forall (a, b) \in \mathbb{R}^{*2})$  . 0,50 ن
- ب) نضع  $G = E \cup F$  ، بين أن :  $(G, \times)$  زمرة . 0,50 ن
- ج) هل  $(G, \times)$  زمرة تبادلية ؟ 0,50 ن

**التمرين الثالث : (3,5 ن)**

- ① حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $z^2 + z + 1 = 0$  . ن 0,75  
 ② لكل عدد عقدي  $z$  حيث :  $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  نضع :  $z' = \frac{1}{z^2 + z + 1}$

مع :  $-\pi \leq \theta \leq \pi$  و  $\theta \neq \frac{2\pi}{3}$  و  $\theta \neq \frac{-2\pi}{3}$

- ① تحقق أن :  $1 + z + z^2 = z(1 + z + \bar{z})$  ن 0,75  
 ② احسب معيار و عمدة  $z'$  بدلالة  $\theta$  . ن 0,75  
 ③ نضع :  $z' = x + iy$  حيث  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  . ن 0,75  
 ببين أن :  $x^2 + y^2 = (1 - 2x)^2$  .  
 ④ استنتج أن  $M$  ذات اللق  $z'$  تنتمي إلى هذلول يتم تحديد مركزه و رأسيه و مقاربيه . ن 0,50

**التمرين الرابع : (10 ن)**

(I) نعتبر  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بما يلي :  $f(x) = \frac{e^{-x}}{x}$

- ① أحسب نهايات  $f$  عند محداث مجموعة تعريفها  $D_f$  . ن 0,50  
 ② أدرس تغيرات الدالة  $f$  . ن 0,50  
 ③ ليكن  $(\mathcal{C})$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في معلم متعامد ممنظم . ن 0,50  
 أدرس الفروع اللانهائية للمنحنى  $(\mathcal{C})$  . ن 0,50  
 بأنشئ  $(\mathcal{C})$  . ن 0,25

(II) لتكن  $(u_n)$  المتتالية العددية المعرفة بما يلي :  $\begin{cases} u_{n+1} = u_n^2 f(u_n) = u_n e^{-u_n} ; (\forall n \in \mathbb{N}) \\ u_0 = 1 \end{cases}$

- ① بين أن :  $e^x \geq x + 1 ; (\forall x \in \mathbb{R})$  . ن 0,25  
 ② استنتج أن :  $x^2 f(x) \leq \frac{x}{x+1} ; (\forall x > 0)$  . ن 0,25  
 ③ أ باستعمال البرهان بالترجع بين أن :  $0 < u_n \leq \frac{1}{n+1} ; (\forall n \in \mathbb{N})$  . ن 0,50

- ببين أن المتتالية  $(u_n)$  متقاربة و حدد نهايتها . ن 0,75

④ نضع من أجل كل عنصر  $n$  من  $\mathbb{N}^*$  :  $v_n = \sum_{k=0}^{n-1} u_k$

- أ بين أن :  $v_n = \ln\left(\frac{1}{u_n}\right) ; (\forall n \in \mathbb{N}^*)$  . ن 0,75  
 ب حدد نهاية المتتالية  $(v_n)$  . ن 0,50

(III) نعتبر الدالة العددية  $F$  المعرفة على  $[0, +\infty[$  بما يلي :

$$F(0) = 2 \ln 2 \quad \text{و} \quad (\forall x > 0) ; F(x) = \int_{x^2}^{4x^2} f(t) dt$$

0,25 ن ① (أ) تحقق أن :  $\int_{x^2}^{4x^2} \frac{1}{t} dt = 2 \ln 2$  ;  $(\forall x > 0)$

0,50 ن (ب) باستعمال نتيجة السؤال ① من الجزء الثاني بين أن :  $-t < e^{-t} - 1 \leq 0$  ;  $(\forall t > 0)$ .

0,50 ن ② (أ) بين أن :  $-3x^2 \leq F(x) - 2 \ln 2 \leq 0$  ;  $(\forall x > 0)$ .

0,25 ن (ب) استنتج أن  $F$  متصلة و قابلة للإشتقاق على اليمين في 0.

0,25 ن ③ (أ) بين أن  $f(t) < e^{-t}$  ;  $(\forall t \geq 1)$ .

0,50 ن (ب) استنتج النهاية التالية :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$

0,75 ن ④ (أ) بين أن  $F$  قابلة للإشتقاق على المجال  $]0, +\infty[$  و احسب  $F'(x)$ .

0,50 ن (ب) اعط جدول تغيرات الدالة  $F$ .

0,50 ن (ج) أنشئ  $(\mathcal{E}_F)$  في معلم متعامد ممنظم.

⑤ لتكن  $G$  الدالة العددية المعرفة على  $]0, +\infty[$  بما يلي :  $G(x) = \int_x^{4x} e^{-t} \ln t dt$

0,50 ن ① (أ) بين أن :  $G(x) = F(\sqrt{x}) - e^{-4x} \ln(4x) + e^{-x} \ln(x)$  ;  $(\forall x > 0)$ .

0,50 ن (ب) أحسب النهاية التالية :  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (e^{-x} - e^{-4x}) \ln x$

0,25 ن (ج) استنتج :  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} G(x)$

1 (أ)

ليكن  $n$  عددا فرديا

$$\text{إذن : } n = 2k + 1 ; (\exists k \in \mathbb{N})$$

$$\Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{N}) ; n^2 = (2k + 1)^2$$

$$\Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{N}) ; n^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

$$\Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{N}) ; n^2 = 4k(k + 1) + 1$$

$k$  و  $(k + 1)$  عددان صحيحان طبيعيين و متتابعان إذن أحدهما فردي و الآخر زوجي. و منه فإن الجداء  $k(k + 1)$  عدد زوجي دائما.

$$\text{إذن : } k(k + 1) = 2m ; (\exists m \in \mathbb{N})$$

$$\text{و بالتالي : } n^2 = 4k(k + 1) + 1 = 8m + 1$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 1 = 8m$$

$$\Leftrightarrow n^2 \equiv 1[8]$$

1 (ب)

ليكن  $n$  عددا زوجيا .

$$\text{هذا يعني أن : } n = 2k ; (\exists k \in \mathbb{N})$$

العدد الصحيح الطبيعي  $k$  يمكن أن يكون فرديا أو زوجيا .

#### الحالة الأولى : $k$ عدد زوجي

$$\text{إذن : } k = 2p ; (\exists p \in \mathbb{N})$$

$$\text{و منه : } n = 4p \text{ يعني : } n^2 = 16p^2 = 8(2p^2)$$

$$\text{إذن : } n^2 \equiv 0[8] \text{ و منه : } n^2 \equiv 0[8]$$

#### الحالة الثانية : $k$ عدد فردي

$$\text{إذن : } k = 2q + 1 ; (\exists q \in \mathbb{N})$$

$$\text{و منه : } n = 4q + 2 \text{ يعني : } n^2 - 4 = 8(2q^2 + 2q)$$

$$\text{إذن : } n^2 - 4 \equiv 0[8] \text{ و منه : } n^2 \equiv 4[8]$$

#### الخلاصة :

$$\text{إذا كان } n \text{ عددا زوجيا فإن : } n^2 \equiv 0[8] \text{ أو } n^2 \equiv 4[8]$$

2 (أ)

نُدَّكَرُ في البداية أن مجموع ثلاثة أعداد فردية هو عدد فردي

و أن مربع أي عدد فردي يكون دائما عددا فرديا .

نفترض أن  $(a^2 + b^2 + c^2)$  مربع كامل.

$$\text{إذن : } (\exists d \in \mathbb{N}) ; a^2 + b^2 + c^2 = d^2 \quad (1)$$

بما أن  $a$  و  $b$  و  $c$  أعداد فردية فإن  $(a^2 + b^2 + c^2)$  عدد فردي كذلك .

$$\begin{cases} a^2 \equiv 1[8] \\ b^2 \equiv 1[8] \\ c^2 \equiv 1[8] \end{cases} \quad \text{و منه حسب نتيجة السؤال 1 (أ)}$$

$$\text{إذن : } a^2 + b^2 + c^2 \equiv 3[8] \quad (2)$$

لدينا  $d$  و  $d^2$  عددان فرديين

$$\text{إذن حسب نتيجة السؤال 1 (أ) : } d^2 \equiv 1[8] \quad (3)$$

من (1) و (2) و (3) نستنتج أن :  $3 \equiv 1[8]$

يعني أن :  $8/2$  و هذا مستحيل حدوثه

و بالتالي  $(a^2 + b^2 + c^2)$  ليس مربعا كاملا.

2 (ب)

لدينا  $a$  و  $b$  و  $c$  أعداد فردية.

$$\begin{cases} a^2 \equiv 1[8] \\ b^2 \equiv 1[8] \\ c^2 \equiv 1[8] \end{cases} \quad \text{إذن حسب نتيجة السؤال 1 (أ) :}$$

$$\text{و منه : } a^2 + b^2 + c^2 \equiv 3[8] \quad (4)$$

و بما أن  $a$  و  $b$  و  $c$  أعداد فردية فإن  $(a + b + c)$  عدد فردي كذلك

$$\text{و منه حسب نتيجة السؤال 1 (أ) : } (a + b + c)^2 \equiv 1[8] \quad (5)$$

من (4) و (5) نستنتج أن :

$$(a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2) \equiv 1 - 3[8]$$

$$\text{يعني : } (a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2) \equiv -2[8]$$

$$\text{و نعلم أن : } -2 \equiv 6[8]$$

$$\text{إذن : } (a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2) \equiv 6[8]$$

$$\text{و منه : } 2(ab + ac + bc) \equiv 6[8] \quad (*)$$

$$\text{لأن : } (a + b + c)^2 = (a^2 + b^2 + c^2) + 2(ab + ac + bc)$$

2 (ج)

نفترض أن العدد  $2(ab + ac + bc)$  مربع كامل.

$$\text{إذن : } 2(ab + ac + bc) = m^2 ; (\exists m \in \mathbb{N})$$

و لدينا  $2(ab + ac + bc)$  عدد زوجي

و منه :  $m$  و  $m^2$  عددان زوجيان .

إذن حسب نتيجة السؤال 1 (ب) :

$$m^2 \equiv 0[8] \text{ أو } m^2 \equiv 4[8]$$

#### في الحالة الأولى : $m^2 \equiv 0[8]$

لدينا حسب نتيجة السؤال 2 (ب)  $m^2 \equiv 6[8]$

إذن :  $6 \equiv 0[8]$  و هذا مستحيل. لأن 8 لا تقسم 6

#### في الحالة الثانية : $m^2 \equiv 4[8]$

لدينا حسب نتيجة السؤال 2 (ب)  $m^2 \equiv 6[8]$

إذن :  $6 \equiv 4[8]$  و هذا مستحيل. لأن 8 لا تقسم 2

و بالتالي :  $2(ab + bc + ac)$  ليس مربعا كاملا.

■ (1) ج

بما أن  $\varphi$  تشاكل تقابلي من  $(\mathbb{R}^*, \times)$  نحو  $(E, \times)$  فإن  $\varphi$  يحافظ على بنية الزمرة.

بما أن :  $(\mathbb{R}^*, \times)$  زمرة تبادلية عنصرها المحايد هو العدد 1 و كل عنصر  $a$  يقبل  $\frac{1}{a}$  كمماتل.

فإن :  $(E, \times)$  زمرة تبادلية عنصرها المحايد هو العدد  $\varphi(1)$  و كل عنصر  $M_a$  يقبل  $\varphi\left(\frac{1}{a}\right)$  كمماتل.

$$\text{و لدينا : } \varphi(1) = M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$\text{و } \varphi\left(\frac{1}{a}\right) = M_{\frac{1}{a}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{1}{a}-a\right) \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

■ (2) ج

ليكن  $N_b$  و  $N_a$  عنصرين من  $F$

$$\begin{aligned} N_a \times N_b &= \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}}\left(a-\frac{1}{a}\right) \\ -a\sqrt{3} & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & \frac{1}{\sqrt{3}}\left(b-\frac{1}{b}\right) \\ -b\sqrt{3} & -b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ab - b\left(a-\frac{1}{a}\right) & \frac{a}{\sqrt{3}}\left(b-\frac{1}{b}\right) - \frac{b}{\sqrt{3}}\left(a-\frac{1}{a}\right) \\ -ab\sqrt{3} + ab\sqrt{3} & -a\left(b-\frac{1}{b}\right) + ab \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{b}{a} & \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{b}{a}-\frac{1}{\frac{b}{a}}\right) \\ 0 & \frac{1}{\frac{b}{a}} \end{pmatrix} = M_{\frac{b}{a}} \end{aligned}$$

■ (2) ب

نضع :  $G = E \cup F$

في البداية يجب أن نبرهن على أن :

$$\forall (a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2 ; M_a \times N_b = N_{\frac{b}{a}} \quad \text{و}$$

$$\forall (a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2 ; N_b \times M_a = N_{ab}$$

لدينا :

$$\begin{aligned} M_a \times N_b &= \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}}\left(a-\frac{1}{a}\right) \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & \frac{1}{\sqrt{3}}\left(b-\frac{1}{b}\right) \\ -b\sqrt{3} & -b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{b}{a} & \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{b}{a}-\frac{a}{b}\right) \\ -\frac{b}{a}\sqrt{3} & \frac{-b}{a} \end{pmatrix} = N_{\frac{b}{a}} \end{aligned}$$

■ (2) د

نفترض أن :  $(ab + bc + ac)$  مربع كامل.

$$\text{إذن : } (\exists m \in \mathbb{N}) ; (ab + bc + ac) = m^2$$

لدينا :  $a$  و  $b$  و  $c$  أعداد فردية.

إذن :  $(ab + bc + ac)$  عدد فردي كذلك.

و منه  $m^2$  عدد فردي . إذن  $m$  عدد فردي

$$\text{و منه حسب } \textcircled{1} \textcircled{1} : m^2 \equiv 1[8]$$

$$\text{أي : } ab + bc + ac \equiv 1[8]$$

$$\text{و منه : } 2(ab + bc + ac) \equiv 2[8]$$

لكن لدينا  $2(ab + bc + ac) \equiv 6[8]$  و ذلك حسب (\*)

$$\text{إذن : } 6 \equiv 2[8]$$

يعني :  $8/4$  و هذا بطبيعة الحال مستحيل.

و بالتالي :  $(ab + bc + ac)$  ليس مربعا كاملا .

■ التمرين الثاني : (3,0 ن)

■ (1) ج

ليكن  $M_b$  و  $M_a$  عنصرين من  $E$

$$\begin{aligned} M_a \times M_b &= \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}}\left(a-\frac{1}{a}\right) \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & \frac{1}{\sqrt{3}}\left(b-\frac{1}{b}\right) \\ 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ab & \frac{a}{\sqrt{3}}\left(b-\frac{1}{b}\right) + \frac{1}{b\sqrt{3}}\left(a-\frac{1}{a}\right) \\ 0 & \frac{1}{ab} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ab & \frac{1}{\sqrt{3}}\left(ab-\frac{1}{ab}\right) \\ 0 & \frac{1}{ab} \end{pmatrix} = M_{ab} \end{aligned}$$

بما أن :  $M_b \in E$  و  $M_a \in E$  فإن :  $a \neq 0$  و  $b \neq 0$  و منه :  $ab \neq 0$

■ (1) ب

ليكن  $a$  و  $b$  عنصرين من  $\mathbb{R}^*$

$$\begin{aligned} \varphi : (\mathbb{R}^*, \times) &\rightarrow (E, \times) \\ a &\rightarrow \varphi(a) = M_a \end{aligned} \quad \text{لدينا :}$$

$$\text{لدينا : } \varphi(a \times b) = M_{ab} = M_a \times M_b = \varphi(a) \times \varphi(b)$$

إذن :  $\varphi$  تشاكل من  $(\mathbb{R}^*, \times)$  نحو  $(E, \times)$

و لدينا :  $(\forall y \in E), (\exists ! a \in \mathbb{R}^*) ; y = \varphi(a) = M_a$

إذن  $\varphi$  تقابل من  $(\mathbb{R}^*, \times)$  نحو  $(E, \times)$  .

و بالتالي :  $\varphi$  تشاكل تقابلي من  $(\mathbb{R}^*, \times)$  نحو  $(E, \times)$  .

و لدينا كذلك :

$$N_b \times M_a = \begin{pmatrix} b & \frac{1}{\sqrt{3}}(b - \frac{1}{b}) \\ -b\sqrt{3} & -b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}}(a - \frac{1}{a}) \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} ab & \frac{1}{\sqrt{3}}(ab - \frac{1}{ab}) \\ -ab\sqrt{3} & -ab \end{pmatrix} = N_{ab}$$

نحن الآن مسلحون بأربع خاصيات مهمة و هي :

$$\begin{cases} M_a \times M_b = M_{ab} & (1) \\ N_a \times N_b = M_{\frac{b}{a}} & (2) \\ M_a \times N_b = N_{\frac{b}{a}} & (3) \\ N_b \times M_a = N_{ab} & (4) \end{cases}$$

لنبرهن على أن  $\times$  قانون تركيب داخلي في  $G$

ليكن  $X$  و  $Y$  عنصرين من  $G$

إذن نفصل هنا بين أربع حالات :

الحالة الأولى:  $X \in E$  و  $Y \in E$

إذن حسب الخاصية رقم (1) :  $X \times Y \in E$  : إذن  $X \times Y \in G$

الحالة الثانية:  $X \in F$  و  $Y \in F$

إذن حسب الخاصية رقم (2) :  $X \times Y \in E$  : إذن  $X \times Y \in G$

الحالة الثالثة:  $X \in E$  و  $Y \in F$

إذن حسب الخاصية رقم (3) :  $X \times Y \in F$  : إذن  $X \times Y \in G$

الحالة الرابعة:  $X \in F$  و  $Y \in E$

إذن حسب الخاصية رقم (4) :  $X \times Y \in F$  : إذن  $X \times Y \in G$

نلاحظ أنه في جميع هذه الحالات الأربع لدينا :

$$\forall (X, Y) \in G^2 ; X \times Y \in G$$

و بالتالي  $\times$  قانون تركيب داخلي في  $G$  .

البحث عن العنصر المحايد :

نعلم أن  $M_1$  هو العنصر المحايد للقانون  $\times$  في  $E$  و ذلك حسب نتيجة السؤال (1) (ج)

و نعلم كذلك أن العنصر المحايد إن وجد يكون دائما وحيدا .

يكفي الآن أن نبرهن أن :

$$\forall A \in G ; A \times M_1 = M_1 \times A = A$$

لتكن  $A$  مصفوفة من  $G$  . نفصل بين حالتين :

الحالة الأولى:  $A$  فرد من أفراد  $E$

إذن :  $A = M_a$  ;  $(\exists! a \in \mathbb{R}^*)$

و لدينا حسب الخاصية رقم (1) :

$$M_a \times M_1 = M_a \text{ و } M_1 \times M_a = M_a$$

إذن :  $A \times M_1 = M_1 \times A = A$

الحالة الثانية:  $A$  فرد من أفراد  $F$

إذن :  $A = N_a$  ;  $(\exists! a \in \mathbb{R}^*)$

و منه حسب الخاصية (4) :  $N_a \times M_1 = N_{a \times 1} = N_a$

و كذلك حسب الخاصية (3) :  $M_1 \times N_a = N_{\frac{a}{1}} = N_a$

نستنتج إذن أن :  $A \times M_1 = M_1 \times A = A$

في كلتا الحالتين لدينا :

$$\forall A \in G ; A \times M_1 = M_1 \times A = A$$

إذن  $M_1$  هو العنصر المحايد لضرب المصفوفات في  $G$  .

التمائل :

$(E, \times)$  زمرة تبادلية و مماثل كل عنصر  $M_a$  يمتلك مماثلا و هو :  $M_{\frac{1}{a}}$

$G$  مجموعة تتكون من اتحاد مجموعتين و هما  $E$  و  $F$

لنبحث عن مماثلات عناصر  $F$  .

ليكن  $N_a$  عنصرا من  $F$  .

إذن حسب الخاصية (2) :  $N_a \times N_a = M_{\frac{a}{a}} = M_1$

و منه كل عنصر  $N_a$  من  $F$  يتماثل مع نفسه

و بالتالي جميع عناصر  $G$  تمتلك مماثلات من  $E$  و  $F$  .

خلاصة السؤال (ب) :  $(G, \times)$  زمرة لأن  $\times$  قانون تركيب داخلي في

$G$  و يقبل عنصرا محايدا وحيدا  $M_1$  و كل عنصر

يملك مماثلا وحيدا من  $G$  .

■ (2) (ب)

ليكن  $M_a$  عنصرا من  $E$  و  $N_b$  عنصرا من  $F$

لدينا حسب الخاصية (3) :  $M_a \times N_b = N_{\frac{b}{a}}$

و لدينا حسب الخاصية (4) :  $N_b \times M_a = N_{ab}$

إذن :  $M_a \times N_b \neq N_b \times M_a$

و بالتالي :  $\times$  ليس تبادليا في  $G$

يعني : الزمرة  $(G, \times)$  ليست تبادلية .

1 ■

نحل المعادلة :  $z^2 + z + 1 = 0$

نحسب  $\Delta$  نجد أن :  $\Delta = (i\sqrt{3})^2$

إذن المعادلة تقبل حلين مترافقين  $z_1$  و  $z_2$  :

$$z_1 = \frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-\frac{2\pi i}{3}} = \bar{j}$$

$$z_2 = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{2\pi i}{3}} = j$$

2 (j) ■

لدينا :  $z = e^{i\theta}$  إذن :  $|z| = 1$  و منه :  $z\bar{z} = 1$

لدينا إذن :  $z(1+z+\bar{z}) = z+z^2+z\bar{z} = z+z^2+1$

2 (b) ■

لدينا  $z' \neq 0$  مُعرَّف لأنه إذا كان  $\theta \neq \pm \frac{2\pi}{3}$  فإن  $z^2 + z + 1 \neq 0$

و لدينا حسب السؤال (j) :  $1+z+z^2 = z(1+z+\bar{z})$

$$z' = \frac{1}{1+z+z^2} = \frac{1}{z(1+z+\bar{z})} \quad \text{إذن :}$$

و منه :

$$|z'| = \left| \frac{1}{z} \right| \cdot \left| \frac{1}{1+z+\bar{z}} \right| = 1 \cdot \frac{1}{1+2\cos\theta} = \left( \frac{1}{1+2\cos\theta} \right)$$

و لدينا كذلك :  $Arg(z') \equiv Arg\left(\frac{1}{z}\right) + Arg\left(\frac{1}{1+z+\bar{z}}\right) [2\pi]$

$$\Leftrightarrow Arg(z') \equiv -Arg(z) + 0 [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow Arg(z') \equiv -\theta [2\pi]$$

$$z' = \left( \frac{1}{1+2\cos\theta} \right) e^{-i\theta} \quad \text{و بالتالي :}$$

2 (c) ■

$$z' = x + iy = \left( \frac{1}{1+2\cos\theta} \right) e^{-i\theta} \quad \text{لدينا :}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\cos(-\theta)}{1+2\cos(\theta)} \\ y = \frac{\sin(-\theta)}{1+2\cos(\theta)} \end{cases} \quad \text{إذن :}$$

و من هذه النظمة نستنتج أن :

$$x^2 + y^2 = \frac{\cos^2(-\theta)}{(1+2\cos(\theta))^2} + \frac{\sin^2(-\theta)}{(1+2\cos(\theta))^2}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = \frac{\cos^2(-\theta) + \sin^2(-\theta)}{(1+2\cos(\theta))^2}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = \left( \frac{1}{1+2\cos(\theta)} \right)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = \left( \frac{1+2\cos(\theta) - 2\cos(\theta)}{1+2\cos(\theta)} \right)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = \left( 1 - 2 \left( \frac{\cos(\theta)}{1+2\cos(\theta)} \right) \right)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = (1-2x)^2$$

2 (b) ■

من آخر نتيجة نستخرج ما يلي :  $x^2 + y^2 = 1 + 4x^2 - 4x$

$$\Leftrightarrow -3x^2 + 4x + y^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 - \frac{4}{3}x - \frac{1}{3}y^2 = \frac{-1}{3}$$

$$\Leftrightarrow \left( x - \frac{2}{3} \right)^2 - \frac{1}{3}y^2 = \frac{-1}{3} + \frac{4}{9}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left( x - \frac{2}{3} \right)^2}{\left( \frac{1}{3} \right)^2} - \frac{y^2}{\left( \frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2} = 1$$

و منه :  $M(z')$  تنتمي إلى الهذلول الذي مركزه هو النقطة  $C\left(\frac{2}{3}, 0\right)$

و رأساه هما  $S_1(1,0)$  و  $S_2\left(\frac{1}{3}, 0\right)$

و مقارباها هما المستقيمان  $(\Delta)$  و  $(\Delta')$  المعرفين بما يلي :

$$\begin{cases} (\Delta) : y = \sqrt{3}x - \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ (\Delta') : y = -\sqrt{3}x + \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

### التمرين الرابع : (10 ن)

1 (I) ■

لدينا :  $\forall x \in ]-\infty, 0[ \cup ]0, +\infty[ : f(x) = \frac{e^{-x}}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{e^{-x}}{x} \right) = \lim_{u \rightarrow -\infty} - \left( \frac{e^u}{u} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left( \frac{e^{-x}}{x} \right) = \lim_{u \rightarrow 0^+} - \left( \frac{e^u}{u} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{e^{-x}}{x} \right) = \lim_{u \rightarrow 0^-} - \left( \frac{e^u}{u} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^{-x}}{x} \right) = \lim_{u \rightarrow -\infty} - \left( \frac{e^u}{u} \right) = 0$$

① (II) ■

نعتبر الدالة:  $\varphi(x) = e^x - x - 1$

لدينا:  $\varphi'(x) = e^x - 1$

إذا كان  $x = 0$  فإن:  $\varphi'(x) = 0$

إذا كان  $x > 0$  فإن:  $\varphi'(x) > 0$

إذا كان  $x < 0$  فإن:  $\varphi'(x) < 0$

و لدينا:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

و لدينا:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \frac{e^x}{x} - 1 - \frac{1}{x} \right) = +\infty$

نستنتج جدول التغيرات التالي:

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$\varphi'(x)$	$-$	$0$	$+$
$\varphi$	$+\infty$	$0$	$+\infty$

نلاحظ أن دالة متصلة على  $\mathbb{R}$  و قيمتها الدنيا هي 0

إذن:  $(\forall x \in \mathbb{R}) ; \varphi(x) \geq 0$

أي:  $(\forall x \in \mathbb{R}) ; e^x \geq (x + 1)$

② (II) ■

لدينا حسب السؤال ①:  $(\forall x \in \mathbb{R}^+) ; e^x \geq x + 1$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{e^x} \leq \frac{1}{x+1}$$

$$\Leftrightarrow e^{-x} \leq \frac{1}{x+1}$$

$$\Leftrightarrow (\forall x > 0) ; xe^{-x} \leq \frac{x}{x+1}$$

$$\Leftrightarrow (\forall x > 0) ; \frac{x^2}{x} e^{-x} \leq \frac{x}{x+1}$$

$$\Leftrightarrow (\forall x > 0) ; x^2 f(x) \leq \frac{x}{x+1}$$

③ (II) ■

من أجل  $n = 0$  لدينا  $u_0 = 1$

يعني:  $0 < u_0 \leq \frac{1}{0+1}$

إذن العبارة صحيحة بالنسبة لـ  $n = 0$

② (I) ■

ليكن  $x$  عنصرا من  $\mathbb{R}^*$

لدينا:  $f'(x) = \frac{-xe^{-x} - e^{-x}}{x^2} = \frac{-e^{-x}(x+1)}{x^2}$

بما أن:  $\frac{-e^{-x}}{x^2} < 0$  فإن إشارة  $f'(x)$  متعلقة فقط بإشارة  $(x+1)$

نستنتج إذن الجدول التالي:

$x$	$-\infty$	$-1$	$0$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$0$	$-$	$-$
$f$	$-\infty$	$-e$	$+\infty$	$0$

③ (I) ■

الفروع اللانهائية:

لدينا:  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

إذن محور الأرتيب مقارب عمودي لـ  $(\mathcal{E})$

و لدينا:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$


إذن محور الأفاصيل مقارب أفقي بجوار  $+\infty$ .

و لدينا:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

إذن  $(\mathcal{E})$  يقبل فرعا شلجيبيا في اتجاه محور الأرتيب نحو الأسفل.

③ (I) ■

تمثيل الدالة  $f$   $(\mathcal{E})$





Ⓜ 4 (II) ■

ليكن  $k \in \mathbb{N}$ . لدينا حسب تعريف المتتالية  $(u_n)_n$  :

$$(\forall k \in \mathbb{N}) ; u_k = u_{k-1} e^{-u_{k-1}}$$

$$\Leftrightarrow (\forall k \in \mathbb{N}) ; \frac{1}{u_k} = \frac{e^{u_{k-1}}}{u_{k-1}}$$

$$\Leftrightarrow (\forall k \in \mathbb{N}) ; \ln\left(\frac{1}{u_k}\right) = \ln\left(\frac{e^{u_{k-1}}}{u_{k-1}}\right)$$

$$\Leftrightarrow (\forall k \in \mathbb{N}) ; \ln\left(\frac{1}{u_k}\right) = \ln(e^{u_{k-1}}) - \ln(u_{k-1})$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{1}{u_k}\right) = \sum_{k=1}^n u_{k-1} - \sum_{k=1}^n \ln(u_{k-1})$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{1}{u_k}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} u_k - \sum_{k=0}^{n-1} \ln(u_k)$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{u_n}\right) + \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\frac{1}{u_k}\right) = v_n - \sum_{k=1}^{n-1} \ln(u_k) - \underbrace{\ln(u_0)}_0$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{u_n}\right) + \left(\sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\frac{1}{u_k}\right) + \sum_{k=1}^{n-1} \ln(u_k)\right) = v_n$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{u_n}\right) + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\ln\left(\frac{1}{u_k}\right) + \ln(u_k)\right) = v_n$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{u_n}\right) + \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\frac{u_k}{u_k}\right) = v_n$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{u_n}\right) + \sum_{k=1}^{n-1} \ln(1) = v_n$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{u_n}\right) + 0 = v_n$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{u_n}\right) = v_n$$

Ⓜ 4 (II) ■

لدينا :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

و لدينا :  $\ln\left(\frac{1}{u_n}\right) = v_n$

إذن :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{1}{u_n}\right) = +\infty$

نفترض أن :  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_n \leq \frac{1}{n+1}$

نتطلق من الطرف  $u_n \leq \frac{1}{n+1}$

$$\Leftrightarrow (n+1)u_n \leq 1$$

$$\Leftrightarrow n u_n + u_n \leq 1$$

$$\Leftrightarrow n u_n + (2u_n - u_n) \leq 1$$

$$\Leftrightarrow n u_n + 2u_n \leq 1 + u_n$$

$$\Leftrightarrow (n+2)u_n \leq (1+u_n)$$

$$\Leftrightarrow \frac{(n+2)u_n}{(1+u_n)} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{u_n}{1+u_n} \leq \frac{1}{n+2}} (*)$$

و لدينا  $u_n \geq 0$  إذن حسب نتيجة السؤال ② :

$$\boxed{(u_n)^2 f(u_n) \leq \frac{u_n}{1+u_n}} (**)$$

من (\*) و (\*\*) نستنتج أن :  $(u_n)^2 f(u_n) \leq \frac{1}{n+2}$

$$\Leftrightarrow (\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < (u_n)^2 f(u_n) \leq \frac{1}{n+2}$$


$$\Leftrightarrow (\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_{n+1} \leq \frac{1}{(n+1)+1}$$

إذن العبارة صحيحة بالنسبة لـ  $(n+1)$

$$\Leftrightarrow (\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_n \leq \frac{1}{n+1} \text{ و بالتالي}$$

Ⓜ 3 (II) ■

بما أن :  $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_n \leq \left(\frac{1}{n+1}\right)$



فإن  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  متتالية متقاربة و  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

III) 3) ب

لدينا حسب السؤال (ج) :  $(\forall t \geq 1) ; f(t) \leq e^{-t}$

و لدينا كذلك حسب التمثيل المبياني للدالة  $f$  :  $(\forall t > 0) ; f(t) \geq 0$

$$\Rightarrow (\forall t > 1) ; f(t) \geq 0$$

ومنه :  $(\forall t \geq 1) ; 0 < f(t) \leq e^{-t}$

$$\Rightarrow 0 < \int_{x^2}^{4x^2} f(t) dt \leq \int_{x^2}^{4x^2} e^{-t} dt$$

$$\Rightarrow 0 < F(x) \leq e^{-x^2} - e^{-4x^2}$$

$$\Rightarrow 0 < F(x) \leq e^{-x^2}(1 - e^{-3x^2})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2}(1 - e^{-3x^2}) = 0(1 - 0) = 0 \quad \text{لدينا :}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0 \quad \text{و بالتالي :}$$

III) 4) ج

لدينا  $f$  دالة متصلة على  $]0, +\infty[$

إذن فهي تقبل دالة أصلية نرمز لها بالرمز  $\varphi$ .

$$\varphi'(x) = f(x) \quad \text{بحيث :}$$

$$F(x) = \int_{x^2}^{4x^2} f(t) dt ; x > 0 \quad \text{لدينا :}$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \int_{x^2}^0 f(t) dt + \int_0^{4x^2} f(t) dt$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \int_0^{4x^2} f(t) dt - \int_0^{x^2} f(t) dt$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \varphi(4x^2) - \varphi(x^2)$$

$$\Rightarrow F'(x) = 8x\varphi'(4x^2) - 2x\varphi'(x^2)$$

$$\Rightarrow F'(x) = 8xf(4x^2) - 2xf(x^2)$$

$$\Rightarrow F'(x) = \frac{8xe^{-4x^2}}{4x^2} - \frac{2xe^{-x^2}}{x^2}$$

$$\Rightarrow F'(x) = \frac{2e^{-4x^2}}{x} - \frac{2e^{-x^2}}{x}$$

$$\Rightarrow F'(x) = \frac{2e^{-x^2}(e^{-3x^2} - 1)}{x}$$

III) 1) ا

ليكن :  $x > 0$

$$\int_{x^2}^{4x^2} \frac{1}{t} dt = [\ln t]_{x^2}^{4x^2} = \ln(4x^2) - \ln(x^2) = \ln 4$$

III) 1) ب

لدينا حسب نتيجة السؤال (II) 1) :  $(\forall x \in \mathbb{R}) ; e^x \geq x + 1$

من أجل العدد  $-x$  نحصل على :  $e^{-x} \geq -x + 1$

$$e^{-x} - 1 \geq -x \quad \text{يعني :}$$

$$-x < 0 \quad \text{إذن } x > 0$$

$$e^{-x} - 1 \leq 0 \quad \text{و منه : } e^{-x} < 1 \quad \text{يعني :}$$

من (1) و (2) نستنتج أن :  $(\forall x > 0) ; -x \leq e^{-x} - 1 \leq 0$

III) 2) ج

ليكن  $x$  عددا حقيقيا موجبا

لدينا :  $-1 < \frac{e^{-t}}{t} - \frac{1}{t} \leq 0$  و منه :  $-t < e^{-t} - 1 \leq 0$

$$\Leftrightarrow - \int_{x^2}^{4x^2} 1 dt < \int_{x^2}^{4x^2} f(t) dt - \int_{x^2}^{4x^2} \left(\frac{1}{t}\right) dt \leq \int_{x^2}^{4x^2} 0 dt$$

$$\Leftrightarrow -3x^2 < F(x) - \ln 4 \leq 0$$

III) 2) ب

لدينا :  $(\forall x > 0) ; -3x^2 \leq F(x) - \ln 4 \leq 0$

$$\Leftrightarrow -3x^2 < \frac{F(x) - 2 \ln 2}{x} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow -3x^2 < \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} \leq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} -3x = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = 0 \quad \text{و بما أن :}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = 0 \quad \text{فان :}$$

و بالتالي  $F$  دالة قابلة للإشتقاق على اليمين في الصفر و نعلم أن

الإشتقاق يستلزم الإتصال إذن  $F$  متصلة على اليمين في الصفر.

III) 3) ا

ليكن  $t$  عددا حقيقيا بحيث  $t \geq 1$  إذن  $\frac{1}{t} \leq 1$

نضرب طرفي هذه المتفاوتة في العدد الحقيقي الموجب قطعاً  $e^{-t}$  نجد :

$$\frac{e^{-t}}{t} \leq e^{-t}$$

$$\Leftrightarrow f(t) \leq e^{-t}$$

⊖ 5 (III) ■

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{-x} - e^{-4x}) \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x} (1 - e^{-3x}) \ln x$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{(3xe^{-x})}_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ 0}} \underbrace{\left( \frac{e^{-3x} - e^0}{-3x - 0} \right)}_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ 1}} \underbrace{(x \ln x)}_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ 0}} = 0$$

⊖ 5 (III) ■

$$G(x) = F(\sqrt{x}) - e^{-4x} (\ln 4 + \ln x) + e^{-x} \ln x \quad \text{لدينا :}$$

$$\Leftrightarrow G(x) = F(\sqrt{x}) + (e^{-x} - e^{-4x}) \ln x - e^{-4x} \ln 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} G(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \underbrace{F(\sqrt{x})}_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ \ln 4}} + \underbrace{(e^{-x} - e^{-4x}) \ln x}_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ 0}} - \underbrace{e^{-4x} \ln 4}_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ -\ln 4}} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} G(x) = 0 \quad \text{و بالتالي :}$$

■ والحمد لله رب العالمين ■

⊖ 4 (III) ■

$$\frac{2e^{-x^2}}{x} > 0 \quad \text{لدينا : } x > 0 \quad \text{إذن :}$$

ومنه فإن إشارة  $F'(x)$  متعلقة بإشارة  $e^{-3x^2} - 1$

ولدينا :  $x > 0$  إذن :  $-3x^2 < 0$  ومنه :  $e^{-3x^2} < 1$


$$\text{أي : } e^{-3x^2} - 1 < 0$$

وبالتالي :  $F'(x) < 0$  ;  $(\forall x > 0)$

نستنتج إذن جدول تغيرات الدالة  $F$  كما يلي :

$x$	0	$+\infty$
$F'(x)$		-
$F$	$2 \ln 2$	0

⊖ 4 (III) ■



⊖ 5 (III) ■

ليكن  $x > 0$ . سوف نستعمل مكاملة بالأجزاء.

$$\text{نضع : } u(t) = \ln t \quad \text{ومنه : } u'(t) = \frac{1}{t}$$

$$\text{ونضع : } v'(t) = e^{-t} \quad \text{ومنه : } v(t) = -e^{-t}$$

$$\text{لدينا : } G(x) = \int_x^{4x} e^{-t} \ln t \, dt = [uv] - \int v u' \, dt$$

$$\Leftrightarrow G(x) = [-\ln t \cdot e^{-t}]_x^{4x} - \int_x^{4x} \frac{-e^{-t}}{t} \, dt$$

$$\Leftrightarrow G(x) = e^{-x} \ln(x) - e^{-4x} \ln(4x) + \int_{(\sqrt{x})^2}^{4(\sqrt{x})^2} \frac{e^{-t}}{t} \, dt$$

$$\Leftrightarrow G(x) = e^{-x} \ln(x) - e^{-4x} \ln(4x) + F(\sqrt{x})$$